



Vedipal® 500

Diosmina - Hesperidina

DIOSMINA 450 mg - HESPERIDINA 50 mg
(Flavonoides Micronizados)
Comprimidos recubiertos

Industria Argentina
Venta Bajo Receta

FÓRMULA:

Cada comprimido recubierto, contiene:
Diosmina 450,00 mg; Hesperidina 50,00 mg.
Excipientes: Lauril sulfato de sodio; Lactosa; Povidona K30; Dióxido de silicio coloidal; Croscarmelosa sódica; Estearato de magnesio; Opadry blanco; Oxido de hierro amarillo (CI 77492); Oxido de hierro rojo (CI 77491); c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Flebotónico. Vasculoprotector. Antihemorroidal.

FARMACOLOGÍA:

Diosmina - Hesperidina (Flavonoides Micronizados) es un venotónico y un vaso protector (produce una vasoconstricción, un aumento de la resistencia de los vasos y una disminución de su permeabilidad).

La asociación farmacológica de Diosmina - Hesperidina (Flavonoides Micronizados) ejerce una triple acción sobre el sistema venoso de retorno; a nivel de las venas y de las vénulas aumenta la tonicidad parietal y ejerce una acción antiestasis venosa; a nivel linfático estimula el drenaje linfático y mejora la actividad linfagoga; a nivel de la microcirculación aumenta la resistencia capilar y normaliza la permeabilidad capilar.

Estas actividades farmacológicas han sido demostradas en estudios doble ciego que han objetivado y cuantificado su actividad sobre la hemodinamia venosa.

La actividad venotónica ha sido establecida por la plestismografía que evidenció una disminución del tiempo de vaciamiento venoso.

La actividad sobre la microcirculación se ha demostrado en estudios doble ciego que han resultado estadísticamente significativos comparados contra placebo.

En pacientes con fragilidad capilar, el aumento de la resistencia capilar post-tratamiento se demostró por la angioestereometría.

FARMACOCINÉTICA:

La absorción es rápida a nivel gastrointestinal, ya que el inicio de su acción está dentro de la primera hora y se mantiene por 24 horas. La vida media de eliminación es de 11 horas, la excreción es esencialmente fecal (80 %) y la eliminación urinaria representa el 14 % de la dosis administrada.

La asociación Diosmina - Hesperidina (Flavonoides Micronizados) es ampliamente metabolizada, como se demuestra por la eliminación de fenoles y de ácido hipúrico por la vía urinaria.

INDICACIONES:

Trastornos de la circulación venosa (piernas pesadas, dolores, impaciencia de primus decubitus). Venotónico, flebotónico (aumenta la tonicidad de las venas), y vasculoprotector (aumenta la resistencia de los pequeños vasos sanguíneos). Crisis hemorroidal. Para el tratamiento de las manifestaciones de la insuficiencia venosa crónica de los miembros inferiores, funcional y orgánica; sensación de pesadez, dolor, calambres nocturnos. A nivel de las venas, disminuye la distensibilidad venosa y reduce la éstasis venosa. A nivel de la microcirculación, normaliza la permeabilidad capilar y refuerza la resistencia capilar.

POSOLOGÍA DOSIFICACIÓN Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:

Insuficiencia venosa:

2 comprimidos recubiertos por día; 1 por la mañana y 1 por la noche.

Mantenimiento de la enfermedad hemorroidal:

2 comprimidos recubiertos por día.

Crisis hemorroidales:

6 comprimidos recubiertos diarios durante los primeros 4 días, luego 4 comprimidos recubiertos diarios los 3 días siguientes.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del producto.
Primer Trimestre del embarazo.

PRECAUCIONES GENERALES:

Crisis hemorroidal: Si los trastornos hemorroidales no desaparecen en 15 días, es indispensable consultar a su médico. La administración de este producto no excluye el tratamiento específico de otras enfermedades anales. El tratamiento debe ser de corta duración. Si los síntomas no disminuyen rápidamente, debe practicarse un examen proctológico y el tratamiento debe ser revisado.

Trastornos de la circulación venosa: Este medicamento demuestra toda su eficacia cuando va acompañado por una buena higiene. Evitar la exposición al sol, el calor, la posición de pie prolongada y el exceso de peso. La marcha y eventualmente el uso de medias adaptadas favorecen la circulación sanguínea.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Embarazo: No se han demostrado en animales efectos teratogénicos. En humanos no se ha demostrado ningún efecto nocivo hasta el momento.

Embarazo categoría B.

Lactancia: Si bien no hay datos actuales no debe administrarse el medicamento durante la lactancia.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:

Aun cuando la tolerabilidad es buena, ocasionalmente se han reportado náuseas y molestias gastrointestinales (menos del 2%) en personas sensibles.





Se han señalado algunos casos de trastornos digestivos leves y trastornos neurovegetativos (sensación de malestar), que no han obligado a suspender el tratamiento.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:

No debe administrarse simultáneamente con antiácidos o alimentos altamente alcalinos ya que puede disminuir su absorción.

Puede administrarse simultáneamente con cualquier otro medicamento.

SOBREDOSIFICACIÓN Y TRATAMIENTO:

Hasta la fecha no existe reporte de accidentes por sobredosis; en el caso de que esto sucediera deberá instituirse el tratamiento sintomático específico y vigilar los signos vitales.

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN, CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA.

HOSPITAL DE PEDIATRÍA RICARDO GUTIÉRREZ

TELÉFONO: (011) 4962-6666/2247

HOSPITAL A. POSADAS

TELÉFONO: (011) 4654-6648/4658-7777

CENTRO DE ASISTENCIA TOXICOLÓGICA DE LA PLATA

TELÉFONO: (0221) 451-5555

CONSERVACIÓN:

Conservar en su envase original a temperatura no mayor de 30° C.
No utilizar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

PRESENTACIÓN:

Envases conteniendo 20, 30 y 60 comprimidos recubiertos.

Fecha de última revisión: Enero 2009

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N°: 54.164

Directora Técnica: Dra. Marina Lorena Manzur, Farmacéutica.

Producto de:
MONTE VERDE S.A.
Ruta Nacional N° 40 s/n° esq. Calle 8, Departamento de Pocito, Provincia de San Juan.

Departamento Científico: Tel.: (011) 4509-7100

